


# Priapismo

**Definición: El priapismo es una persistente e indeseada erección del pene.**

El priapismo puede presentarse en una de las siguientes maneras:

1. Pueden ocurrir repetidas pero reversibles erecciones dolorosas durante un período de varias horas (erección, luego desaparece, erección, luego desaparece, etc.) Esto también se llama priapismo "tartamudeante." Una vez que el episodio mejora no hay problemas con el funcionamiento sexual. Episodios repetidos de este tipo de priapismo son comunes y ocurren hasta en un 40% de los pacientes.



Este tipo de priapismo generalmente se puede manejar en casa. Se recomienda que los pacientes tomen baños de agua tibia, aumenten su consumo de líquidos y vacíen la vejiga (orinen) con frecuencia. Si el episodio no mejora en unas 3 horas, notifique al doctor. Tome Tylenol para dolor.

2. Puede haber una erección dolorosa prolongada que no desaparece por más de varias horas. Esto puede continuar por varios días o semanas.

Este tipo de priapismo necesita atención médica. Sin tratamiento médico el priapismo severo puede causar parcial o total impotencia en más de 80% de los casos. En ocasiones se dan transfusiones de sangre durante el ataque.

3. Engrandecimiento o endurecimiento persistente del pene, que puede durar por semanas o hasta años. Este tipo de priapismo generalmente no causa dolor. Comúnmente se desarrolla después de un episodio largo de priapismo (como se describe en el #2 más arriba). El funcionamiento sexual muchas veces es afectado (por ejemplo-impotencia).

## **¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTOS ATAQUES?**

Las causas específicas de priapismo en pacientes con anemia de célula falciforme se desconocen. Los ataques agudos muchas veces empiezan mientras la persona está durmiendo o después de la actividad sexual, aunque con frecuencia no se puede identificar un evento o causa.

## **PREVENCIÓN**

En el presente no hay ningún programa ni terapia para prevenir los ataques de priapismo. No hay ninguna manera de predecir quién desarrollará priapismo e impotencia. A los pacientes con ataques repetidos se les recomienda evitar períodos prolongados de distensión de la vejiga (evitar estar mucho tiempo sin orinar), deshidratación y actividades sexuales muy prolongadas.

Your physician may be able to provide you with a regular medication to prevent episodes.